

*En France, l'évolution des populations est suivie à travers l'examen des tableaux de chasse nationaux, départementaux et communaux. Cette approche est probablement imparfaite, car les niveaux de prélèvement dépendent de nombreux facteurs (effectifs présents, pression et modalités de chasse...). Cependant, on admet que sur le moyen terme, les tendances d'évolution des populations vivantes et des prélèvements sont similaires.*

# La situation du sanglier en France





**E**ntre 1974 et 2001, le prélèvement annuel a été multiplié par huit. Cette augmentation a été particulièrement sensible sur les douze dernières années, avec une hausse quasi linéaire du nombre d'animaux tués qui est passé d'environ 100 000 à plus de 400 000 par an de 1989 à 2001.

Cette évolution du tableau national se retrouve bien évidemment au niveau régional avec cependant des variations marquées d'une région à l'autre. Les écarts régionaux s'amplifient notamment depuis les années 1990. Ainsi, dans le nord-est, on observe une hausse limitée dans certaines régions (Lorraine, Jura, Bourgogne) et beaucoup plus rapide sur les départements possédant une loi locale (Alsace, Moselle) et la Champagne-Ardenne. Cependant la hausse la plus forte s'est produite dans la région de garrigue méditerranéenne, où le tableau de chasse s'est envolé de moins de 15 000 animaux prélevés en 1990 à plus de 60 000 en 1998. Une analyse chronologique au niveau départemental sur des moyennes tri-annuelles permet de visualiser de façon très nette cette augmentation des effectifs de sanglier, soulignant au passage des taux de multiplication locaux bien supérieurs au résultat national, comme dans le département du Nord. ■


# Évolution annuelle des prélèvements nationaux.

▲ Saisons cynégétiques  
(saison 2001 = 2001-2002).  
Source : Réseau de correspondants ONCFS - FDC.





# Évolution des prélèvements départementaux entre 1986 et 2001.



Source : Réseau de correspondants ONCFS - FDC.





▲ Période 1986 à 1988.




▲ Période 1994 à 1996.



▲ Période 1999 à 2001.



▲ Coefficient multiplicateur (1986 et 2001).



Extrait de la brochure « **La gestion du sanglier** – *des pistes et des outils pour réduire les populations* »  
Chapitre La situation du sanglier en France page 5 à 7